

hm hospitales Servicio de Medicina Nuclear

Consentimiento informado y medidas a observar tras una dosis de 5 mci de yodo radiactivo

Durante las primeras 24 horas

- Procurará mantener 2 metros de distancia con las personas con las que convive.
- Es aconsejable dormir en cuarto aparte.
- Cada vez que vaya al aseo, dejará correr repetidas veces (2 a 3) el agua del inodoro.
- Las orinas se emitirán en posición de sentado (importante para el sexo masculino).
- Mantendrá riguroso aseo personal (preferible ducha).
- Así mismo, es aconsejable esmero en la limpieza del inodoro (utilice guantes de goma), cubiertos y ropa.
- No acuda a espectáculos públicos.

Durante los 5 días posteriores al tratamiento

- Procurará no mantener contacto físico con niños de corta edad y embarazadas.
- Evitará viajes en transporte público que se prevea duren más de 2 horas.

Hasta los 6 meses posteriores al tratamiento

 Es aconsejable que, si es de sexo femenino, no quede embarazada, y no embarace si es del sexo masculino.

SE RECOMIENDA I.L.T. DE: DIAS.

En \tilde{o} \tilde{o}

PacienteRepresentante legalMédicoD.N.I:D.N.I.:Nº Col.:Fdo.:Fdo.:Fdo.:

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.).

DENEGACIÓN/REVOCACIÓN

Después de ser informado de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto de forma libre y consciente mi **DENEGACIÓN/REVOCACIÓN** (táchese lo que no proceda) para su realización, haciéndome responsable de las consecuencias que puedan derivarse de esta decisión.

PacienteRepresentante legalMédicoD.N.I.:D.N.I.:Nº Col.:Fdo.:Fdo.:Fdo.:

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.).

MUY IMPORTANTE: ESTE TRATAMIENTO NO SE PUEDE ADMINISTRAR A MUJERES

EMBARAZADAS O QUE CREAN PUEDAN ESTARLO.