

## + Preparación para colangiopancreatografía retrógrada endoscópica – CPRE +

**Alcance:** Pacientes que van a someterse a una prueba de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica- CPRE.

### RECUERDE:

- 6 horas antes de su cita NO podrá ingerir sólidos.
- 4 horas antes de su cita NO podrá tomar líquidos (ni agua).
- Debe venir acompañado por un adulto.
- Se le asignará una habitación para cursar el ingreso de al menos 24 horas, para su observación.
- Si usted es diabético se aconseja dieta líquida 12 horas antes de su cita. (Teniendo en cuenta que 4 horas antes no podrá tomar nada).

### Si su medicación habitual es:

- **Anticoagulantes orales como:** Sintrom®, Aldocumar®, Rivaroxabán/Xarelto®, Davigatrán /Pradaxa®, Apixabán/Eliquis®, etc. o **Antiagregantes orales como:** Clopidogrel/Iscover®/Plavix®, etc., debe contactar con su médico para valorar suspensión o sustitución.
- **Ácido Acetilsalicílico (Aspirina®/Adiro®) a dosis diarias superiores a 300 mg,** debe reducir a 100 mg durante los 7 días previos a la CPRE, consultado previamente con su médico.
- **Antidiabéticos Orales:** no tomarlos desde que inicia el ayuno de líquidos (4 horas antes).
- **Insulina:** no es necesario modificar su pauta. Excepto que su ayuno se prolongue a más de 8 horas, en esta situación deberá disminuir su dosis habitual. **En caso de hipoglucemia** puede ingerir medio vaso de agua con una cucharada de azúcar para revertirla.
- **Si usted es Hipertenso, NO debe suspender su medicación.** La puede tomar hasta 2 horas antes con una mínima cantidad de agua, la necesaria para tragar.