

CONSEJOS TRAS LA REALIZACION DE UNA POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA

Alcance: Pacientes que han sido sometidos a una extirpación de uno o varios pólipos mediante una corriente de electrocoagulación en el HM Universitario Sanchinarro.

Habitualmente no se producen complicaciones, pero le recomendamos siga las siguientes instrucciones:

1. Permanecerá en reposo relativo (no caminar en exceso, no levantar peso, no subir escaleras, ni cualquier actividad que requiera esfuerzo físico, etc.) durante las 24 horas siguientes al procedimiento. No realizará esfuerzos físicos, ni trabajos responsables. No conducirá.
2. Durante 24 horas tomará una dieta blanda (sopa, infusiones, purés, arroz, yogurt, flanes, natillas, etc.), evitando comidas grasas.
3. La expulsión de una pequeña cantidad de sangre en la deposición es normal y no debe preocuparse.
4. Si presentase, dolor abdominal, fiebre o sangre abundante en las heces, acudirá directamente al área de urgencias del hospital.
5. Puede suceder que el pólipo extirpado no haya sido recuperado en el momento de la endoscopia. Si lo expulsase al realizar la deposición, puede recogerlo y traerlo con la mayor brevedad posible a la Unidad de Endoscopia-Aparato Digestivo. Nosotros lo remitiremos para su análisis.
6. Evitará la toma de antiinflamatorios durante 10 días.
7. En la medida de lo posible, evite viajes largos durante las 48 horas siguientes a la polipectomía.

Si tiene alguna duda pregunte al médico realizador de la prueba.

SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA
HM UNIVERSITARIO SANCHINARRO