

## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

### Dosis diaria:

Le han prescrito una dosis de Abiraterona (ZYTIGA®) de \_\_\_\_\_. Usted debe tomar \_\_\_\_\_ comprimidos 1 vez al día.

### Normas para la correcta administración:

Este medicamento **no se debe tomar junto con alimentos**, por ello debe tomar el comprimido al menos, 1 hora antes o 2 después de la comida principal que usted elija.

Tome todos los comprimidos juntos (sin masticar, disolver o fraccionar) junto con un vaso de agua.

### ¿Cuándo tomar la medicación?

	Desayuno	Comida	Cena	¿Cómo administrarlo?
				Tomar con alimentos

Debe seleccionar una hora del día, excluyendo el horario de las comidas principales:

Dosis	1000 mg	➔	Número de Comprimidos	4 comprimidos	Para elegir el día:
-------	---------	---	-----------------------	---------------	---------------------

Recomenda: Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA  
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO  
DE  
FARMACIA

# Abiraterona ZYTIGA®

## HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

## ABIRATERONA (ZYTIGA®)

### ¿Qué es y para que se utiliza?

- ✦ Abiraterona es un medicamento indicado en el tratamiento de ciertos tumores de próstata.

### ¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✦ Su médico le indicará la dosis y el número de comprimidos que usted tiene que tomar. La dosis habitual es **1.000 mg/día (4 comprimidos de 250 mg)**.
- ✦ Abiraterona se toma una vez al día. Los comprimidos deben tomarse **en ayunas**, es decir, 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.
- ✦ Debe tomar los comprimidos enteros con agua, uno tras otro y es importante que los tome todos los días a la misma hora.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- ✦ Alteraciones en las pruebas hepáticas: aumento de las enzimas hepáticas y posible alteración de los valores en las analíticas.
- ✦ Alteraciones cardíacas: es poco frecuente, pero puede aparecer alteración del ritmo cardíaco, con palpitaciones, y tener sensación de falta de aire (disnea).
- ✦ Riesgo de fracturas óseas.
- ✦ Hipertensión arterial.
- ✦ Retención de líquidos en las extremidades y disminución de potasio en sangre.
- ✦ Infecciones urinarias.

### Precauciones

- ✦ Evite actividades que puedan ocasionarle caídas.
- ✦ Controle su tensión arterial de forma periódica.

- ✦ Palpitaciones intensas y sensación de falta de aire. Debilidad muscular y contracciones involuntarias debidas a la disminución de potasio.
- ✦ Picor, ojos o piel amarillenta, orina oscura y dolor o malestar en la parte superior derecha del estómago.

- ✦ **Embarazo**: es importante evitarlo durante el tratamiento, por lo que se deberá utilizar medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento. **Lactancia**: suspenda la lactancia antes de iniciar el tratamiento.
- ✦ Interacciones: **No tome zumo de pomelo** durante el tratamiento, informe a su médico de los medicamentos y productos de herbolario (Hipérico) que esté tomando.
- ✦ Este medicamento contiene **sodio** (6,8 mg) y **lactosa** (189 mg).

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✦ Si olvida tomar Abiraterona, tome la medicación tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra ya próximo a la toma de la siguiente dosis. **Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido.**

### ¿Cómo se debe conservar?

- ✦ Conservar a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C).

### Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO**