

## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

### Dosis diaria:

Le han prescrito una dosis de Vinorelbina (NAVELBINE®) de \_\_\_\_\_ 1 vez a la semana.

### Normas para la correcta administración:

Las cápsulas se deben tomar **enteras** con agua, con algo de alimentos.

### ¿Cuándo tomar la medicación?

	Desayuno 	Comida 	Cena 	¿Como administrarlo?
<b>Navelbine 20 mg</b> 				Se recomienda con algo de alimento
<b>Navelbine 30 mg</b> 				

Debe seleccionar el día de la semana:

Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo

Recuerde: Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA  
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO  
DE  
FARMACIA

# Vinorelbina NAVELBINE®

## HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

# VINOELBINA (NAVELBINE®)

## ¿Qué es y para que se utiliza?

- ✳ Este medicamento se utiliza para el tratamiento de distintas enfermedades oncológicas.

## ¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✳ Su médico le indicará la dosis adecuada en función de su peso y altura.
- ✳ Vinorelbina se administra una vez a la semana.
- ✳ Lávese las manos antes y después de manipular el medicamento.
- ✳ El laboratorio sugiere que la persona que maneje este medicamento utilice guantes y mascarilla.
- ✳ **Las cápsulas deben tomarse enteras (sin masticarlas, chuparlas o disolverlas) con un poco de agua.**
- ✳ Se recomienda la administración **con algo de alimento en el estómago** (nunca con zumo de pomelo)
- ✳ Si vomita al cabo de pocas horas de la toma del fármaco, no debe repetir nunca la administración de la dosis.

## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- ✳ Alteraciones gastrointestinales: diarrea, náuseas, vómitos, estreñimiento y pérdida de apetito.
- ✳ Trastornos de la sangre: Disminución de glóbulos rojos (anemia) , blancos (neutropenia) y plaquetas
- ✳ Caída del cabello
- ✳ Sensación de cansancio, fiebre
- ✳ Sensación de hormigueo en manos y pies (neuropatía).

## Precauciones

- ✳ En caso de presentar alguno de los síntomas que se detallan a continuación, deberá ponerse en contacto con su médico o acudir a un centro sanitario:
  - ✳ **Diarrea:** si incrementa en más de 4 las deposiciones al día con respecto a sus deposiciones normales.
  - ✳ **Fiebre:** si tiene una temperatura mayor a 38º C.

- ✳ El líquido de la cápsula es irritante, si entra en contacto con piel, mucosas u ojos, debe lavarse la zona inmediatamente con agua o suero fisiológico y comunicarlo al médico.
- ✳ Debe desechar el envase y todo lo que haya estado en contacto con las cápsulas (guantes, mascarilla, ...) en un contenedor especial que le proporcionará el Servicio de Farmacia
- ✳ Contiene pequeñas cantidades de **etanol** y **sorbitol**.
- ✳ **Embarazo:** es importante evitarlo durante el tratamiento, por lo que se deberá utilizar medidas anticonceptivas eficaces.
- ✳ **Lactancia:** suspenda la lactancia antes de iniciar el tratamiento.

## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✳ Si olvida tomar Vinorelbina, tome la medicación tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra ya próximo a la toma de la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar el tratamiento
- ✳ **Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido**

## ¿Cómo se debe conservar?

- ✳ Conservar en **nevera** (entre 2 y 8 °C).

## Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con el Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Las cápsulas sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO**