

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Dosis diaria:

Le han prescrito Voriconazol (VFEND®) _____ mg cada ____ horas.

Normas para la correcta administración:

Las comprimidos deben tomarse en ayunas (al menos una hora antes o dos horas después de las comidas).

¿Cuándo tomar la medicación?

| | Desayuno  1 hora antes o 1 hora después | Comida  1 hora antes o 1 hora después | Cena  1 hora antes o 1 hora después | ¿ Como administrarlo? |
|--|---|---|---|-----------------------|
| VFEND 200 mg  |  |  |  | En ayunas |

Recuerde: Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico.

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO
DE
FARMACIA

Voriconazol VFEND®

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: _____

Fecha: _____

VORICONAZOL (VFEND®)

¿Qué es y para que se utiliza?

- ✳ Es un medicamento indicado en el tratamiento de distintas infecciones fúngicas.

¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✳ Su médico le indicará la dosis adecuada según su patología.
- ✳ Voriconazol se administra cada 12 horas.
- ✳ Los comprimidos deben **tomarse sin alimentos**, al menos una hora antes o una hora después de las comidas.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- ✳ **Generales:** dolor de cabeza, fiebre
- ✳ **Alteraciones gastrointestinales:** dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea.
- ✳ **Alteraciones en la piel:** erupción, exantema.
- ✳ **Alteración de la visión:** visión borrosa, percepción alterada de la luz, molestias con luz intensa.
- ✳ **Fotosensibilidad**

Precauciones

- ✳ Se recomienda evitar la exposición intensa o prolongada a la luz solar durante el tratamiento y **usar protectores solares**, cuando sea necesario.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✳ Si olvida tomar Voriconazol a su hora habitual, tome la medicación tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra ya próximo a la toma de la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar el tratamiento
- ✳ **Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido**

¿Cómo se debe conservar?

- ✳ Conservar a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C). Proteger del calor, la humedad y la luz.

Identificación



Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con el Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO