

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Dosis diaria:

Le han prescrito una dosis de Capecitabina (XELODA®) de _____ mg al día.
Deberá tomarlo durante _____ días seguidos, cada _____ días.

Normas para la correcta administración:

Los comprimidos se deben tomar con agua, de 20 a 30 minutos **después** del desayuno y la cena.

¿Cuándo tomar la medicación?

	Desayuno 	Comida 	Cena 	¿Como administrarlo? 20 minutos después del desayuno y la cena
				

Recuerde: Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico.

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO
DE
FARMACIA

Capecitabina XELODA®

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: _____

Fecha: _____

CAPECITABINA (XELODA®)

¿Qué es y para que se utiliza?

- ✳ Este medicamento se utiliza para el tratamiento de distintas enfermedades oncológicas.

¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✳ Su médico le indicará la dosis adecuada según su peso y altura.
- ✳ Capecitabina se administra dos veces al día.
- ✳ **Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua 20 ó 30 minutos después del desayuno y la cena.**

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- ✳ Alteraciones gastrointestinales: especialmente diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, llagas en la garganta y/o en la boca.
- ✳ Reacción cutánea mano-pie: Produce enrojecimiento, dolor, picor o ampollas en las palmas de las manos o en las plantas de los pies.
- ✳ Fatiga y/o palpitaciones.
- ✳ Alteraciones en el sabor de los alimentos.

Precauciones

- ✳ En caso de presentar alguno de los síntomas que se detallan a continuación, deberá ponerse en contacto con su médico o acudir a un centro sanitario:
 - ✳ **Diarrea**: si incrementa en más de 4 las deposiciones al día con respecto a sus deposiciones normales.
 - ✳ **Fiebre**: si tiene una temperatura mayor a 38º C.
 - ✳ **Dolor torácico**.
- ✳ Advierta a su médico si está tomando:
 - ✳ Medicamentos para disminuir la coagulación de la sangre (como el Sintrom®)
 - ✳ Medicamentos para la gota.
 - ✳ Medicamentos para las convulsiones o temblores.
- ✳ Este medicamento contiene **lactosa**.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✳ Si olvida tomar Capecitabina a su hora habitual y:
 - han pasado menos de 6 horas: tome la dosis olvidada tan pronto como sea posible y posteriormente continúe con el horario habitual.
 - han pasado más de 6 horas: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar el tratamiento
- ✳ **Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido**

¿Cómo se debe conservar?

- ✳ Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30 °C)

Identificación



Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con el Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Las cápsulas sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO