

## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

### Dosis dosis:

Le han prescrito una dosis de Lapatinib (TYVERB®) de \_\_\_\_\_ mg. Usted debe tomar \_\_\_\_\_ comprimidos 1 vez al día.

### Normas para la correcta administración:

Este medicamento **no se debe tomar junto con alimentos**, por ello debe tomar el comprimido al menos, 1 hora antes o 1 después de la comida principal que usted elija.

Tomar todos los comprimidos juntos (sin masticar, disolver o fraccionar) junto con un vaso de agua.

## ¿Cuándo tomar la medicación?

 <b>Tyverb® 250 mg</b>	 Desayuno 1 hora antes ó 1 hora después 	 Comida 1 hora antes ó 1 hora después 	 Cena 1 hora antes ó 1 hora después 	¿Como administrarlo?  En ayunas
--	--	--	--	--

Debe seleccionar una hora del día, excluyendo el horario de las comidas principales:

Dosis	➔	Número de Comprimidos	Hora elegida del día:
-------	---	--------------------------	--------------------------

Recuerde: Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA  
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO  
DE  
FARMACIA

# Lapatinib TYVERB®

## HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

# LAPATINIB (TYVERB®)

## ¿Qué es y para que se utiliza?

- ✳ Lapatinib es un medicamento indicado en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer.

## ¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✳ Su médico le indicará la dosis y el número de comprimidos que usted tiene que tomar. La dosis habitual es 1250 mg (5 comprimidos) o 1500 mg (6 comprimidos).
- ✳ Lapatinib se administra una vez al día
- ✳ Los comprimidos deben tomarse **en ayunas**, es decir, 1 hora antes o 1 hora después de las comidas.
- ✳ Debe tomar los comprimidos que su médico le haya prescrito enteros con agua, uno tras otro, a la misma hora cada día.
- ✳ Es importante que tome todos los comprimidos que le ha pautado su médico todos los días a la misma hora en relación con las comidas.

## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- ✳ **Alteraciones gastrointestinales:** especialmente **diarrea** aunque también se pueden producir vómitos, dolor abdominal, llagas en la boca y/o garganta.
- ✳ **Alteraciones en la piel:** es frecuente que se produzca el **Síndrome de mano-pie** (enrojecimiento, dolor, picor o ampollas en las palmas de las manos o en las plantas de los pies) o **exantema** (dermatitis acneiforme). Otras alteraciones frecuentes son: erupción cutánea, pérdida de pelo, sequedad en la piel y/o inflamación de las uñas.
- ✳ **Alteraciones cardíacas:** es poco frecuente, pero puede aparecer latidos cardíacos irregulares y tener sensación de falta de aire (disnea).
- ✳ **Alteraciones generales:** Fatiga, cansancio y pérdida de apetito

## Precauciones.

- ✳ En el caso de que tenga diarrea, es muy importante que tome algunas precauciones:
  - Beba mucho líquido para evitar la deshidratación (agua, bebidas isotónicas, etc...).
  - Coma alimentos habituales en una dieta astringente con bajo contenido en grasas.

- ✳ En caso de presentar alguno de los síntomas que se detallan a continuación, deberá ponerse en contacto con su médico o acudir a un centro sanitario:
  - Diarrea: si incrementa en más de 4 las deposiciones al día con respecto a sus deposiciones normales.
  - Disnea (falta de aire) persistente y palpitations intensas
  - Picor, ojos o piel amarillenta, orina oscura y dolor o malestar en la parte superior derecha del estómago.
- ✳ Para cuidar la piel, se recomienda el **uso de cremas hidratantes (sin urea) y con protección solar**, productos hipoalergénicos y que no contengan jabón.
- ✳ **Embarazo:** es importante evitarlo durante el tratamiento, por lo que se deberá utilizar medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento y al menos dos semanas después de la suspensión del mismo.
- ✳ **Lactancia:** suspenda la lactancia antes de iniciar el tratamiento.
- ✳ Este medicamento contiene un derivado de **almidón** (carboximetilalmidón).

## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✳ Si olvida tomar Lapatinib a su hora habitual, tome la medicación tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra ya próximo a la toma de la siguiente dosis.
- ✳ **Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido**

## ¿Cómo se debe conservar?

- ✳ Conservar a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C).

## Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.