

+ Consejos para pacientes/familiares tras la aplicación de adhesivo tisular cutáneo +

ALCANCE

Pacientes/familiares a los que se les ha aplicado adhesivo tisular cutáneo (Dermabond).

QUÉ DEBE SABER

1. **No se debe aplicar en la herida ninguna medicación líquida u oleosa** mientras no se haya desprendido la película del adhesivo, pues podría debilitarse disminuyendo la fuerza de unión entre los bordes antes de que se haya producido la cicatrización.

2. **Mantener seca la herida: especialmente las primeras 4 horas**

Se puede mojar breve y ligeramente la herida para duchar al niño. Tras la ducha breve hay que secar suavemente la zona con una toalla mediante presión, sin fricción. Después se puede colocar un apósito seco encima. No hay que limpiar la herida ni permitir que el niño vaya a nadar, tratando de evitar que realice actividades que le hagan sudar mucho hasta que el adhesivo se desprenda.

3. **Proteger la herida: no raspar, frotar ni desprender la película de adhesivo hasta que se desprenda espontáneamente**

Si se desprende antes de que la herida estuviera cicatrizada, se podría alterar este proceso. Algunos niños pequeños pueden arañar o pellizcar el adhesivo. Para evitarlo es recomendable aplicar un apósito seco o tirita sobre la herida, una vez el adhesivo se ha secado.

Estas tiritas se deben cambiar diariamente hasta que el adhesivo se desprenda.

Hay que proteger la herida de traumatismos locales hasta que esté bien cicatrizada, así como de la exposición prolongada a los rayos solares o lámparas uva.

Un ligero enrojecimiento, inflamación o molestias locales son frecuentes en la mayoría de heridas, y van mejorando a medida que va cicatrizando, pero si el edema o el dolor aumentan deben traer al niño a Urgencias.