

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Dosis diaria:

Le han prescrito una dosis de Anagrelida (XAGRID®) de ____ mg al día.

Normas para la correcta administración:

- * Se administra dos veces al día. Puede tomarse con o sin alimentos.
- * Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlas.

¿Cuándo tomar la medicación?

	Desayuno 	Comida 	Cena 	¿Cómo administrarlo? Con o sin alimentos
				

Recuerde: Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico.

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO
DE
FARMACIA

Anagrelida XAGRID®

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: _____

Fecha: _____

HM
HOSPITALES
Somos tu Salud

ANAGRELIDA (XAGRID®)

¿Qué es y para que se utiliza?

- * Anagrelida es un medicamento que está indicado para la reducción del recuento elevado de plaquetas.

¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- * Su médico le indicará la dosis y el número de comprimidos que usted tiene que tomar.
- * Se administra dos veces al día. Puede tomarse con o sin alimentos.
- * Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlas.
- * Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Cansancio
Dolor de cabeza, mareos, somnolencia
Náuseas, diarrea
Palpitaciones.
Retención de líquidos.
Erupciones en la piel y cambio del color.
Puede aumentar el riesgo de hemorragias, tenga cuidado con los utensilios que corten.

Precauciones

- * Si tiene una enfermedad hepática, renal o cardíaca moderada o grave.
- * Si ha padecido alguna enfermedad que afecte de manera importante la absorción intestinal o si se ha sometido a una resección quirúrgica de intestino o estómago.

- * Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada.
- * Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

¿Cuándo no se debe tomar Anagrelida?

- * Si usted es alérgico a Anagrelida, así como a cualquiera de los componentes de la cápsula como lactosa.
- * Si está embarazada o en período de lactancia.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- * Si ha olvidado una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.
- * **Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido.**

¿Cómo se debe conservar?

- * Conservar a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C).

Identificación

- * Cápsulas duras opacas de color blanco con la inscripción 'S 063'

Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO