





ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Dosis y normas para la correcta administración:

Etanercept se administra vía subcutánea (bajo la piel) una o dos veces por semana, según le haya prescrito su médico. Elija un día fijo y hágalo siempre el mismo día y a la misma hora.

 ENBREL	 Desayuno	 Comida	 Cena	¿Cómo administrarlo? Vía subcutánea		
Seleccione los días de la semana:						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo

Recuerdos: Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Observaciones:

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO
DE
FARMACIA

Etanercept ENBREL®

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: _____

Fecha: _____

HM
HOSPITALES
Somos tu Salud


ETANERCEPT (ENBREL®)

¿Qué es y para que se utiliza?

- ✦ Etanercept es un agente biológico que actúa reduciendo el dolor y la inflamación asociados a ciertas enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica o psoriasis.

¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✦ Etanercept se administra vía subcutánea (bajo la piel) una o dos veces por semana, según le haya prescrito su médico. Elija un día fijo y hágalo siempre el mismo día y a la misma hora.
- ✦ Lávese las manos meticulosamente antes de cada inyección, limpie el sitio de inyección con la toallita impregnada en alcohol que se suministra con el medicamento.
- ✦ Elija una zona en su muslo o abdomen para realizar la inyección. Si es en el abdomen no debe hacerlo cerca del ombligo. Alterne las zonas de inyección y elija otra zona si tiene la piel enrojecida o un cardenal.



- ✦ Tras la inyección, presione con un algodón o gasa el sitio de inyección durante unos segundos. NO frote.
- ✦ Se recomienda sacar de la nevera la jeringa que vaya a inyectarse al menos 15 minutos antes. Dicha jeringa NUNCA debe reutilizarse.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- ✦ Etanercept puede causar efectos adversos aunque no todos los pacientes los sufren. Los más frecuentes son: resfriado, bronquitis, infecciones urinarias, enrojecimiento y/o picor en la zona de inyección y fiebre.
- ✦ Otros que pueden aparecer son: erupción, hinchazón de la cara y/o pies, dificultad para tragar o respirar, sensación de calor, nerviosismo y palpitaciones.

- ✦ Se desconocen los efectos de Etanercept en la mujer embarazada y no se recomienda su uso durante el embarazo.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✦ Si olvidó inyectarse una dosis debe inyectarla en cuanto se acuerde. Si la próxima dosis le toca al día siguiente, debe saltar la dosis que olvidó ponerse.

¿Cómo se debe conservar?

- ✦ Conservar en nevera entre 2 y 8 °C. No congelar. Si el medicamento está fuera de la nevera temporalmente consulte al Servicio de Farmacia.
- ✦ Si el polvo no se disuelve adecuadamente o hace espuma, espere a que esté claro y nítido antes de administrarlo.

Identificación



Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas, aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito.
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO